

# 血液透析室

## 留置雙腔導管的注意事項

制訂日期:98年4月20日  
修訂日期:112年4月27日

### 一、目的

主要是提供給沒有永久性血管通路的透析病人，接受血液透析時的一種暫時性血管通路，一般留置約二星期至一個月。

### 二、留置部位

內頸靜脈、鎖骨下靜脈（頸部）、股靜脈（大腿腹股溝）。

### 三、自我照顧注意事項

- 1、睡姿勿壓迫傷口處，應避免睡向插管側。
- 2、導管應正確固定，若導管有晃動情形，應重新黏貼固定。
- 3、導管之管夾、橡皮塞需維持關閉，勿自行開關調整，鬆脫時可能造成感染，應告知護理人員處理。
- 4、放置導管處肢體避免動作過大，以免導管滲血，甚至滑脫。
- 5、導管勿做一般輸液通路。

### 四、留置不同部位之自我照顧重點

- 1、留置於頸部（內頸靜脈、鎖骨下靜脈）之導管：
  - ①沐浴採擦澡方式，胸部以下可用水沖洗，但需避免弄濕傷口，以免造成發炎感染情形。
  - ②請著寬鬆及前扣式上衣，避免套頭式衣服，以免拉扯導管。
  - ③可使用鬆緊帶、髮夾、網罩、頭箍、浴帽等用物，固定導管末端避免搖動，以免穿刺處出血及皮膚傷口感染。
  - ④頭髮清潔採平躺式洗頭方式，清洗時以塑膠布覆蓋傷口處，避免弄濕傷口，造成發炎感染情形。
- 2、留置於大腿腹股溝（股靜脈）之導管：
  - ①儘量減少大腿彎曲及下床活動，以免導管彎曲及靜脈血回流，造成導管阻塞。
  - ②沐浴宜採擦澡方式，避免弄濕傷口，造成發炎感染情形。
  - ③宜穿著寬鬆內、外褲，避免更衣時造成導管之牽扯移位。
  - ④保持會陰處的清潔，避免大小便時弄濕或弄髒傷口，必要時至洗腎室換藥。

### 五、出院返家如有下列情形，請至醫院求治

- 1、導管留置處有紅、腫、熱、痛之發炎現象。
- 2、導管留置處之縫線脫落。
- 3、導管末端橡皮塞鬆脫時可能造成感染，須即刻至醫院求治。
- 4、導管留置處敷料滲血，以手壓迫出血點十分鐘以上，須即刻至醫院求治。
- 5、導管不慎脫出時，以手壓迫傷口止血，須即刻至醫院求治。

### 六、諮詢方法

若對以上內容有疑問或建議，請洽詢(04)24922000 轉分機 1601、1602 或 E-mail 至 wfcc.hos@msa.hinet.net

霧峰澄清醫院 關心您!!