

### 一、各型肝炎病毒是怎樣傳染的？

- 1、透析病人 A 型肝炎發生率並沒有比一般人高，其傳染途徑為糞口傳染，其病況同一般的臨床病程。
- 2、B 型肝炎是經由血液、體液或是經由傷口感染的，部份的人受感染之後身體產生抗體而有了免疫力，部份的人和那些來自母親垂直感染的，因無法排除病毒而使得 B 型肝炎病毒長期存在肝細胞內，我們稱之為 B 型肝炎帶原者。
- 3、C 型肝炎也是經由血液或體液感染，透析病人的 C 肝抗體(Anti-HCV Ab)的盛行率比一般健康人高。

### 二、病毒性肝炎的症狀：

B 型、C 型肝炎的症狀與 A 型肝炎相似，一般人多無症狀，須經驗血才能確定。

- 1、部份的人會有食慾不振、全身無力、疲倦、噁心、嘔吐等。
- 2、少數病況比較嚴重的患者，會有黃疸，使皮膚和眼白呈黃色，尿呈茶褐色。
- 3、B、C 型肝炎部份會變成慢性。

### 三、如何預防感染病毒性肝炎？

預防感染 B、C 肝炎的方法，必須提高警覺，作到下列各預防措施：

- 1、不使用別人的牙刷、刮鬍刀，避免以未經消毒的儀器紋身、紋眉、穿耳洞和不正常的性行為。
- 2、驗血確定自己未感染 B 型肝炎病毒且無抗體者，應注射 B 肝疫苗。
- 3、懷孕時要驗血，若孕婦為 e 抗原陽性之 B 型肝炎帶原者，新生兒務必於出生 24 小時內先接受一劑 B 型肝炎免疫球蛋白，之後再按時接種三劑 B 型肝炎疫苗注射，其他新生兒於出生後 3-5 天、滿一個月及滿六個月，各接受一劑 B 型肝炎疫苗注射。

### 四、諮詢方法：

若對以上內容有疑問或建議，請洽詢(04)24922000 轉分機 1700、1800、1900 或 E-mail 至 wfcc.hos@msa.hinet.net